

# Impfkalender 2022 – Welche Impfungen sind empfohlen?

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand Januar 2022

**Säuglinge und Kleinkinder**  
(2 – 23 Monate)

**Kinder und Jugendliche**  
(2 – 17 Jahre)

**Erwachsene**  
(ab 18 Jahre)

Impfungen	6 Wochen	U4 2	U4 3	U4 4	U5 5-10	U6 11*	U6 12	13-14	15	U7 16-23	U7a/U8 2-4	U9 5-6	U10 7-8	U11/J1 9-14	15-16	J2 17	ab 18	ab 60
Rotaviren	G1 <sup>a</sup>		G2	(G3)														
Tetanus		G1 <sup>b</sup>		G2		G3 <sup>c</sup>	N				A1	N	A2	N			A alle 10 Jahre	
Diphtherie		G1 <sup>b</sup>		G2		G3 <sup>c</sup>	N				A1	N	A2	N			A alle 10 Jahre	
Keuchhusten (Pertussis)		G1 <sup>b</sup>	N	G2		G3 <sup>c</sup>	N				A1	N	A2	N			A3 <sup>e</sup>	N
Hib (Haemophilus influenzae Typ b)		G1 <sup>b</sup>		G2		G3 <sup>c</sup>	N											
Kinderlähmung (Poliomyelitis)		G1 <sup>b</sup>		G2		G3 <sup>c</sup>	N							A		N		
Hepatitis B		G1 <sup>b</sup>		G2		G3 <sup>c</sup>	N											
Pneumokokken		G1 <sup>b</sup>	N	G2		G3 <sup>c</sup>	N											S <sup>g</sup>
Meningokokken C							G1	N										
Masern						G1	N		G2	N								S <sup>f</sup>
Mumps						G1	N		G2	N								
Röteln						G1	N		G2	N								
Windpocken (Varizellen)						G1	N		G2	N								
HPV (Humane Papillomviren)													G1 <sup>d</sup> +G2 <sup>d</sup>	N				
Gürtelrose (Herpes Zoster)																		G1 <sup>h</sup> +G2
Grippe (Influenza)																		S <sup>jährlich</sup>

Personen ab 6 Monate mit chronischen Erkrankungen (jährlich) und für Schwangere

- J** Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Jugendliche
- U** Impftermin bei Früherkennungsuntersuchung Kinder
- N** Nachholimpfung (bei unvollständigem Impfschutz)
- A** Auffrischimpfung
- G** Grundimmunisierung (bis zu vier Teilimpfungen G1-G4)
- S** Standardimpfung

- a** die 1. Impfung möglichst ab dem Alter von 6 Wochen, je nach Impfstoff 2 bzw. 3 Schluckimpfungen (G2/G3) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen
  - b** Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfung im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Impfungen)
  - c** Mindestabstand zur vorangegangenen Impfung: 6 Monate
  - d** 2 Impfungen (im Abstand von mindestens 5 Monaten) für Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren; bei Nachholen der Impfung beginnend im Alter ≥ 15 Jahre oder bei einem Abstand von weniger als 5 Monaten zwischen den beiden Impfungen ist eine dritte Impfung erforderlich
  - e** einmalige Auffrischung, möglichst mit der nächsten Impfung gegen Tetanus/Diphtherie/ggf. Poliomyelitis
  - f** einmalige Impfung für alle nach 1970 geborene Erwachsene mit unklarem Impfschutz, ohne Impfung oder nur einer Impfung in der Kindheit
  - g** Impfung mit sogenanntem Polysaccharid-Impfstoff
  - h** zweimalige Impfung mit dem Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 und maximal 6 Monaten
- \* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und Windpocken können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden.



**Aktuelle Informationen zur Corona-Schutzimpfung finden Sie auf unserer Seite [infektionsschutz.de](https://www.infektionsschutz.de)**